

対象患者： 膵臓がん 根拠文献：Cancer Chemother Pharmacol 2018; 81: 1017  
 レジメン名： mFOLFIRINOX  
 1コースの日数： 14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	14
1	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○		
3	レボホリナート 生理食塩液	200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○		
4	イリノテカン塩酸塩水和物 5%ブドウ糖液	150 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	1時間30分	○		
5	フルオロウラシル 生理食塩液	2,400 mg/m <sup>2</sup> 150 mL	点滴静注	46時間	○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

- ・ アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1) 、 80 mg/day 分1 (Day2-3)
- ・ デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-4)

Rp3及びRp4は同時に投与開始

Rp5はインフューザーポンプを使用