

対象患者： 膵臓がん

根拠文献： J Clin Oncol 2019; 49: 1093

レジメン名： GEM+S-1療法

1コースの日数： 21日

| No. | 抗がん剤名<br>(溶解液、支持療法等も含む)     | 標準的投与量                            | 投与方法 | 投与時間 | Day |   |   |   |    |   |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|
|     |                             |                                   |      |      | 1   | ~ | 8 | ~ | 15 | ~ |
| 1   | デキサメタゾン<br>パロノセトロン<br>生理食塩液 | 6.6 mg<br>0.75 mg<br>50 mL        | 点滴静注 | 15分  | ○   |   | ○ |   |    |   |
| 2   | ゲムシタビン<br>生理食塩液             | 1,000 mg/m <sup>2</sup><br>100 mL | 点滴静注 | 30分  | ○   |   | ○ |   |    |   |
| 3   | 生理食塩液                       | 50 mL                             | 点滴静注 | 15分  | ○   |   | ○ |   |    |   |

備考：

上記と合わせてS-1を下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服。

- ・ BSA<1.25：80 mg/day 分2
- ・ 1.25≦BSA<1.5：100 mg/day 分2
- ・ 1.5≦BSA：120 mg/day 分2

2コース実施