

対象患者：非ホジキンリンパ腫

根拠文献：J Clin Oncol. 2020;38(2):155-165.

レジメン名：PV-BR

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day			
					1	2	~	21
1	グラニセトロン塩酸塩 デキサメタゾン 生理食塩液	1 mg 6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	○	○		
2	ベンダムスチン 生理食塩液	90 mg/m ² 50 mL	点滴静注	10分	○	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○	○		
4	リツキシマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	375 mg/m ² total 250mLになるように調製	点滴静注	備考欄参照	○			
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○			
6	ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え) 生理食塩液	1.8 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分 (初回) 30分 (継続)	○			
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○			

備考：

リツキシマブ投与30分前にアセトアミノフェン400mg/回及びd-クロルフェニラミンマレイン酸塩2mg/回を内服。

また、制吐剤として下記を内服。

・アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1) 、80 mg/day 分1 (Day2-3)

リツキシマブはDay3以降に変更することがある。また、リツキシマブの初回投与は入院で実施する。

当院におけるリツキシマブの投与速度は下記のとおり。

・初回：25mL/hrで開始し、1時間後に100mL/hr、その後200mL/hrに増速。

・2回目以降：100mL/hrで開始し、30分後に200mL/hrに増速。