

対象患者： 大腸がん 根拠文献：J Clin Oncol 2008; 26: 3523

レジメン名： 外来用FOLFOX+BV J Clin Oncol 2007; 25: 2691

1コースの日数： 14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	14
1	ベバシズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液注	5 mg/kg 50 mL	点滴静注	10分	○		
2	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	6.6 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	レボホリナート 生理食塩液	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	○		
4	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	○		
5	フルオロウラシル	400 mg/m ²	ワンショット静注		○		
6	フルオロウラシル 生理食塩液	2,400 mg/m ² 150 mL	点滴静注	46時間	○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

・デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-3)

Rp3及びRp4は同時に投与開始

Rp6はインフューザーポンプを使用