

対象患者：胃がん

根拠文献：Cancer Chemother Pharmacol. 2018 Nov;82(5):839-845

レジメン名：CPT-11+RAM

1コースの日数：14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	14
1	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 50mL	点滴静注	15分	○		
2	dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	15分	○		
3	ラムシルマブ(遺伝子組換え) 生理食塩液	8mg/kg 250mL	点滴静注	1時間(初回) 30分(継続)	○		
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		
5	イリノテカン 5%ブドウ糖注	150mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間30分	○		
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		

備考：

制吐剤として下記を内服

デキサメタゾン8mg/day 分2 (day2-3)

※ラムシルマブは治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対してパクリタキセル以外の抗悪性腫瘍剤との併用における有効性及び安全性は確立していないが、ガイドラインにはイリノテカン+ラムシルマブ併用の記載あり。