

対象患者：胃がん

根拠文献：Cancer Chemother Pharmacol. 2019 Jun;83(6):1175-1181

レジメン名：XELOX+Tmab

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	21
1	トラスツズマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	8mg/kg（初回） 6mg/kg（継続） 250mL	点滴静注	1時間30分（初回） 30分（継続）	○		
2	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	9.9mg 0.75mg 50mL	点滴静注	15分	○		
3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間	○		
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		

備考：

上記と併せてカペシタピンを下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服。

BSA < 1.36 : 2400mg/day 分2

1.36 ≦ BSA < 1.66 : 3000mg/day 分2

1.66 ≦ BSA < 1.96 : 3600mg/day 分2

1.96 ≦ BSA : 4200mg/day 分2

制吐剤として下記を内服

デキサメタゾン8mg/day 分1または2（day2-3）