対象患者：胃がん　　根拠文献：Bull Cancer. 2015 Apr;102(4):324-31

レジメン名：FOLFOX+Tmab

1コースの日数：42日

| No. | 抗がん剤名<br>（溶解液、支持療法等も含む） | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | ～ | 8 | ～ | 15 | ～ | 22 | ～ | 29 | ～ | 35 | ～ | 42 |
| 1 | トラスツズマブ（遺伝子組換え）<br>生理食塩液 | 8mg/kg（初回）<br>6mg/kg（継続）<br>250mL | 点滴静注 | 1時間30分（初回）<br>30分（継続） | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| 2 | デキサメタゾン<br>パロノセトロン<br>生理食塩液 | 6.6mg<br>0.75mg<br>50mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
| 3 | レボホリナート<br>生理食塩液 | 200mg/㎡<br>250mL | 点滴静注 | 2時間 | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
| 4 | オキサリプラチン<br>5%ブドウ糖液 | 85mg/㎡<br>250mL | 点滴静注 | 2時間 | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
| 5 | フルオロウラシル | 400mg/㎡ | ワンショット静注 | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
| 6 | フルオロウラシル<br>生理食塩液 | 2400mg/㎡<br>150mL | 点滴静注 | 46時間 | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | |

備考：
制吐剤として下記を内服
　デキサメタゾン8mg/day 分1または2（day2-3）

Rp3及びRp4は同時に投与開始
Rp6はインフューザーポンプを使用

※初回のトラスツズマブの実際の投与タイミングはDay2以降となることあり。