

対症患者：頭頸部癌

根拠文献:Ann Oncol 2018 Apr;29:1004

レジメン名：PCE

1コースの日数： 21日

1コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day					
					1	~	8	~	15	~
1	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	6.6mg 20mg 50mL	点滴静注	15分	○		○			
2	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	15分					○	
3	dl- クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	15分	○		○		○	
4	セツキシマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	400mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間	○					
5	セツキシマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	250mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間			○		○	
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		○		○	
7	グラニセトロン 生理食塩液	1mg 50mL	点滴静注	15分	○		○			
8	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間	○		○			
9	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC2.5 250mL	点滴静注	1時間	○		○			
10	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		○			

2コース目以降

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day					
					1	~	8	~	15	~
1	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	6.6mg 20mg 50mL	点滴静注	15分	○		○			
2	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	15分					○	
3	dl- クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	15分	○		○		○	
4	セツキシマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	250mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間	○		○		○	
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		○		○	
6	グラニセトロン 生理食塩液	1mg 50mL	点滴静注	15分	○		○			
7	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間	○		○			
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC2.5 250mL	点滴静注	1時間	○		○			
9	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		○			

備考：最大6コースまで