

せん妄アセスメントシート

STEP 1 せん妄のリスク

- 70歳以上 脳器質障害（脳転移含む） 認知症 アルコール多飲
 せん妄の既往 ベンゾジアゼピン系薬剤内服 その他()

当てはまらない

経過観察

状態一括登録
「なし」に登録

1つでも当てはまればせん妄ハイリスク対応

●せん妄を予防するケアの実施

- ・疼痛コントロール
- ・脱水の予防
- ・活動を促す（身体拘束をさける）
- ・ベンゾジアゼピン系薬剤の使用を避ける

●せん妄になりやすい時期や要因をアセスメント

- せん妄ハイリスクについて共有
 - ・「せん妄ハイリスク」とカルテに記載
 - ・看護計画「急性混乱のリスク状態」を立案
 - ・カンファレンス等で情報や対応方法（STEP3を参照）を共有
 - ・せん妄ハイリスクパンフレットを用いて患者・家族に説明

STEP2 せん妄症状のチェック

！POINT！ 「何か変？」と感じた行動や言動をチェックしよう

	精神症状	具体的な症状と確認するポイント
見る	<input type="checkbox"/> 注意障害・意識レベルの変容	<input type="checkbox"/> ボーっとしている <input type="checkbox"/> もうろうとしている
	<input type="checkbox"/> 注意障害	<input type="checkbox"/> 今までできていたことができなくなる 例) 内服管理ができなくなる 例) 服装がだらしなくなる、ベッドの周りが散らかっている <input type="checkbox"/> 視線が合わずに、キョロキョロしている <input type="checkbox"/> ルートを触ったり、体を起こしたり・横になったり、同じ動作を繰り返す <input type="checkbox"/> 周囲の音や看護師の動きに気をとられる
話す	<input type="checkbox"/> 注意障害・意識レベルの変容	<input type="checkbox"/> 質問に対する反応が遅い <input type="checkbox"/> 焦燥感が強く、落ち着かない <input type="checkbox"/> 目がギラギラしている
	<input type="checkbox"/> 注意障害	<input type="checkbox"/> 話がまわりくどく、まとまらない <input type="checkbox"/> つじつまがあわない <input type="checkbox"/> 感情が短時間でころころと変わる
	<input type="checkbox"/> 注意障害	<input type="checkbox"/> 何度も同じことを聞く <input type="checkbox"/> 話に集中できない <input type="checkbox"/> 質問と違う答えが返ってくる
聞く	<input type="checkbox"/> 注意障害	<input type="checkbox"/> 見当識障害（急に出現する場合） （時間） ■ 今日の日付を聞く ■ 今の時間が何時頃か聞く （場所） ■ 今いる場所について尋ねる 例) 自宅から病院までどうやって来るか聞いてみる
	<input type="checkbox"/> 注意障害	<input type="checkbox"/> 近時記憶の障害（急に出現する場合） ■ 最近あった出来事を覚えているか聞く 例) ごはんのメニューを覚えているか 例) 入院した日にちや治療した日を覚えているか
	<input type="checkbox"/> 意識レベルの変容	<input type="checkbox"/> 思考のまとまりづらさ ■ 「ボーっとしたり、普段と比べて考えがまとまりにくいことがありますか？」と聞く
確認する	<input type="checkbox"/> 急性発症もしくは症状の変動	<input type="checkbox"/> 日内変動や数日での変化 ■ 症状の出現や以前との様子の変化を患者・家族、スタッフから直接聞く、カルテを確認する
	<input type="checkbox"/> 睡眠覚醒リズム	<input type="checkbox"/> 昼夜逆転の有無を患者に直接聞く、スタッフに確認する

1つでも当てはまれば

当てはまらない

次の時には評価（STEP2）を繰り返す

- 1週間に1回 ● 手術後1病日、3病日、5病日 ● 身体症状の変化
- 「何か変？」と感じた時（例：眠れない、不安、息苦しい、痛い等いつもと違う訴えがある）

STEP 3 せん妄対応

- せん妄の出現時期から原因についてアセスメントし、せん妄の見直しをもって、患者目標を検討
- せん妄について共有
 - ・「せん妄症状が疑われる」とカルテに記載
 - ・看護計画「急性混乱」を立案
 - ・状態一括登録で「せん妄」に変更
 - ・医師に「せん妄症状あり」を報告（初回のみ）
- ・情報共有のための、カンファレンスを検討
- ・せん妄パンフレットを用いて、患者・家族に説明

体	<input type="checkbox"/> 炎症	感染兆候の検索と対応、熱苦痛の緩和
	<input type="checkbox"/> 低酸素	低酸素の評価と酸素投与の検討
	<input type="checkbox"/> 電解質異常 (Na,Ca)	採血データの確認、補正
	<input type="checkbox"/> 脱水	飲水励行、脱水補正
	<input type="checkbox"/> 便秘	排便の確認と排便コントロール
	<input type="checkbox"/> 疼痛	疼痛の評価と適切な疼痛マネジメント
環境	<input type="checkbox"/> 睡眠への障害	睡眠時間中のケアや処置を極力避ける
	<input type="checkbox"/> 低活動	日中の活動を促す、身体拘束をさける
	<input type="checkbox"/> 聴力障害・視覚障害	眼鏡や補聴器の使用、耳垢の除去
脳	<input type="checkbox"/> 環境変化による戸惑い	安全な環境作り（転倒転落予防、ルート類を整理） 危険物の撤去を検討 転棟や部屋移動を避ける
	<input type="checkbox"/> 理解力低下	適切な照明とわかりやすい標識 見当識を促す（時計とカレンダーの設置） 家族や友人との定期的な面会
薬	<input type="checkbox"/> せん妄の原因となる薬	中止あるいは減量が可能か検討 （ベンゾジアゼピン系薬剤、オピオイド など）
	<input type="checkbox"/> せん妄症状を改善する薬	リスペリドン、クエチアピン など