

対象患者：非ホジキンリンパ腫 根拠文献：Lancet 2013;381:1203-1210.

レジメン名：BR

1コースの日数：28日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day			
					1	2	～	28
1	グラニセトロン塩酸塩 デキサメタゾン 生理食塩液	1 mg 6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	○	○		
2	ベンダムスチン 生理食塩液	90 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	10分	○	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○	○		
4	リツキシマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> total 250mLになるように調製	点滴静注	備考欄参照	○			
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○			

備考：

リツキシマブ投与30分前にアセトアミノフェン400mg/回及びd-クロルフェニラミンマレイン酸塩2mg/回を内服。

また、制吐剤として下記を内服。

・アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1)、80 mg/day 分1 (Day2-3)

リツキシマブはDay3以降に変更することがある。また、リツキシマブの初回投与は入院で実施する。

当院におけるリツキシマブの投与速度は下記のとおり。

・初回：25mL/hrで開始し、1時間後に100mL/hr、その後200mL/hrに増速。

・2回目以降：100mL/hrで開始し、30分後に200mL/hrに増速。