

対象患者：非ホジキンリンパ腫 根拠文献：N Engl J Med. 2002;346(4):235-242.

レジメン名：R-CHOP

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	ビンクリスチン 生理食塩液	1.4 mg/m ² (max 2 mg) 20 mL	ワンショット静注	-	○		
2	グラニセトロン塩酸塩 生理食塩液	1 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	ドキシソルビシン 生理食塩液	50 mg/m ² 50 mL	点滴静注	15分	○		
4	シクロホスファミド 生理食塩液	750 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30分	○		
5	リツキシマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	375 mg/m ² total 250mLになるように調製	点滴静注	備考欄参照	○		
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

抗腫瘍効果を目的にプレドニゾン100mg/dayをDay1 から Day5 まで内服する。

リツキシマブ投与30分前にアセトアミノフェン400mg/回及びd-クロルフェニラミンマレイン酸塩2mg/回を内服。

リツキシマブはDay2以降に変更することがある。また、リツキシマブの初回投与は入院で実施する。

当院におけるリツキシマブの投与速度は下記のとおり。

- ・初回：25mL/hrで開始し、1時間後に100mL/hr、その後200mL/hrに増速。
- ・2回目以降：100mL/hrで開始し、30分後に200mL/hrに増速。