

対象患者： 非小細胞肺癌 根拠文献： N Engl J Med 2018; 378: 2288

レジメン名： Atezo+CBDCA+PTX+BEV

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	21
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分 (プライミング用)	○		
2	アテゾリズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	1,200 mg/body 250 mL	点滴静注	1時間(初回) 30分(継続)	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
4	ファモチジン デキサメタゾン 生理食塩液	20 mg 16.5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
5	d/-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
6	ベバシズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	1時間30分(初回) 30分(継続)	○		
7	パロノセトロン 生理食塩液	0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
8	パクリタキセル 生理食塩液	200 mg/m ² 500 mL	点滴静注	3時間	○		
9	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC6 250 mL	点滴静注	1時間	○		
10	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

制吐剤として下記内服を検討する。

・アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1) 、 80 mg/day 分1 (Day2-3)