

対象患者： 非小細胞肺癌

根拠文献： N Engl J Med 2006; 355: 2542

レジメン名： CBDCA+PTX+BEV

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	ファモチジン デキサメタゾン 生理食塩液	20 mg 16.5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	d/-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	ペバシズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	1時間30分(初回) 30分(継続)	○		
4	パロノセトロン 生理食塩液	0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
5	パクリタキセル 生理食塩液	200 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	3時間	○		
6	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC6 250 mL	点滴静注	1時間	○		
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

制吐剤として下記内服を検討する。

・アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1) 、 80 mg/day 分1 (Day2-3)