

対象患者： 非小細胞肺癌 根拠文献： -
 レジメン名： Atezo+CDDP+PEM
 1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	8 mEq 10 mEq 500mL	点滴静注	1時間	○		
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
3	アテゾリズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	1,200 mg/body 250 mL	点滴静注	1時間(初回) 30分(継続)	○		
4	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
5	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
6	ペメトレキセド 生理食塩液	500 mg/m ² 100 mL	点滴静注	10分	○		
7	マンニトールS注射液®	300 mL	点滴静注	45分	○		
8	シスプラチン 生理食塩液	75 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		
9	補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	10 mEq 500mL	点滴静注	1時間	○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

- ・ アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1) 、 80 mg/day 分1 (Day2-3)
- ・ デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-4)

治療 1 週間前より、副作用予防としてビタミンB₁₂ 1 mg (9週間隔で筋注) 及び葉酸0.5 g (連日内服) の投与を開始する。