

対象患者：非小細胞肺癌

根拠文献：Cancer Sci. 2004 Aug;95(8):691-5.

レジメン名称：CDDP+VNR

1コースの日数：28日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day				
					1	～	8	～	28
1	補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液(開始液)	8 mEq (8 mL) 10 mEq (10 mL) 500 mL	点滴静注	1 時間	○				
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	○				
3	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75 mg (50 mL) 9.9 mg 235 mg	点滴静注	30 分	○				
4	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5 分			○		
4	ビノレルビン 生理食塩液	20 mg/m ² 50 mL	点滴静注	10 分	○		○		
5	マンニトールS注射液®	300 mL	点滴静注	45 分	○				
6	シスプラチン 生理食塩液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1 時間	○				
7	補正用塩化カリウム液 1号液(開始液)	10 mEq (10 mL) 500 mL	点滴静注	1 時間	○				
8	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分			○		

備考：

放射線60Gy/30fr併用