

対象患者：非小細胞肺癌

根拠文献：N Engl J Med. 2023 Aug 10;389(6):491-503.

レジメン名称：Pembro+CDDP+PEM

N Engl J Med. 2018 May 31;378(22):2078-

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	21
1	補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液（開始液）	8 mEq (8mL) 10 mEq (10mL) 500 mL	点滴静注	1 時間	○		
2	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	○		
3	ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	200mg/body 50ml	点滴静注	30 分	○		
4	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	○		
5	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75mg (50mL) 9.9mg 235mg	点滴静注	30 分	○		
6	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 100ml	点滴静注	10 分	○		
7	マンニトールS注®	300mL	点滴静注	45 分	○		
8	シスプラチン 生理食塩液	75 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1 時間	○		
9	補正用塩化カリウム液 1号液（開始液）	10 mEq (10mL) 500 mL	点滴静注	1 時間	○		

備考：術前治療の場合は4コース実施、術後はPembro単剤を13コース実施。

治療1週間前より、副作用予防としてビタミンB12 1 mg（9週間隔で筋注）及び葉酸0.5 mg（連日内服）の投与を開始する。