

対象患者：非小細胞肺癌

根拠文献：J Clin Oncol. 2008 Jul 20;26(21):3543-51.

レジメン名称：CDDP+PEM

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	21
1	補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液(開始液)	8 mEq (8 mL) 10 mEq (10 mL) 500 mL	点滴静注	1 時間	○		
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	○		
3	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75 mg (50 mL) 9.9 mg 235 mg	点滴静注	30 分	○		
4	ペメトレキセド 生理食塩液	500 mg/m ² 100 mL	点滴静注	10 分	○		
5	マンニトールS注射液®	300 mL	点滴静注	45 分	○		
6	シスプラチン 生理食塩液	75 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1 時間	○		
7	補正用塩化カリウム液 1号液(開始液)	10 mEq (10 mL) 500 mL	点滴静注	1 時間	○		

備考：

治療 1 週間前より、副作用予防としてビタミンB12 1 mg（9週間隔で筋注）及び葉酸0.5 mg（連日内服）の投与を開始する。