

対象患者：非小細胞肺がん

根拠文献：Lancet Oncol. 2021 Feb;22(2):198-211.

レジメン名称：Nivo+Ipi+CBDCA+PEM

1コースの日数：42日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day				
					1	～	22	～	42
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	5 分（プライミング用）	○		○		
2	ニボルマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	360mg/body 100ml	点滴静注	30 分	○		○		
3	生理食塩液	100ml	点滴静注	30 分	○				
4	イピリムマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	1mg/kg 25ml	点滴静注	30 分	○				
5	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	○		○		
6	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75mg（50mL） 9.9mg 235mg	点滴静注	30 分	○		○		
7	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m2 100ml	点滴静注	10 分	○		○		
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=5～6 250ml	点滴静注	1 時間	○		○		
9	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	○		○		

備考：

治療 1 週間前より、副作用予防としてビタミンB12 1 mg（9週間隔で筋注）及び葉酸0.5 mg（連日内服）の投与を開始する。