

対象患者：非小細胞肺癌

根拠文献：N Engl J Med. 2022 May 26;386(21):1973-1985.

レジメン名称：Nivo+CBDCA+PEM

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	5分 (プライミング用)	○		
2	ニボルマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	360mg/body 100ml	点滴静注	30分	○		
5	生理食塩液	50ml	点滴静注	15分	○		
6	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75mg (50mL) 9.9mg 235mg	点滴静注	30分	○		
7	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 100ml	点滴静注	10分	○		
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=5 250ml	点滴静注	1時間	○		
9	生理食塩液	50ml	点滴静注	15分	○		

備考：術前治療として3コース実施する

治療1週間前より、副作用予防としてビタミンB12 1 mg (9週間隔で筋注) 及び葉酸0.5 mg (連日内服) の投与を開始する。