

対象患者：非小細胞肺がん
レジメン名称：Nivo+CBDCA+PTX

根拠文献：N Engl J Med. 2022 May 26;386(21):1973-1985.

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
	(溶解液、支持療法も含む)				1	～	21
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	5 分（プライミング用）	○		
2	ニボルマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	360mg/body 100ml	点滴静注	30 分	○		
5	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	○		
6	ファモチジン デキサメタゾン 生理食塩液	20mg 16.5mg 50ml	点滴静注	15 分	○		
7	ポララミン 生理食塩液	5mg 50ml	点滴静注	15 分	○		
8	パロノセトロン点滴静注バッグ ホスネツピタント	0.75mg（50mL） 235mg	点滴静注	30 分	○		
9	パクリタキセル 生理食塩液	200mg/m2 500ml	点滴静注	3 時間	○		
10	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=5～6 250ml	点滴静注	1 時間	○		
11	生理食塩液	50ml	点滴静注	15 分	○		

備考：術前治療として3コース実施する