

対象患者：悪性胸膜中皮腫

根拠文献：Lancet. 2023 Dec 16;402(10419):2295-2306.

レジメン名称：Pembro+CDDP+PEM(悪性胸膜中皮腫)

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液(開始液)	8 mEq (8 mL) 10 mEq (10 mL) 500 mL	点滴静注	1 時間	○		
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5 分	○		
3	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	200 mg/body 50 mL	点滴静注	30 分	○		
4	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	○		
5	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75 mg (50 mL) 9.9 mg 235 mg	点滴静注	30 分	○		
6	ペメトレキセド 生理食塩液	500 mg/m ² 100 mL	点滴静注	10 分	○		
7	マンニトールS注射液®	300 mL	点滴静注	45 分	○		
8	シスプラチン 生理食塩液	75 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1 時間	○		
9	補正用塩化カリウム液 1号液(開始液)	10 mEq (10 mL) 500 mL	点滴静注	1 時間	○		

備考：治療 1 週間前より、副作用予防としてビタミンB12 1 mg (9週間隔で筋注) 及び葉酸0.5 mg (連日内服) の投与を開始する。