<u>対象患者:悪性胸膜中皮腫</u> 根拠文献: Lancet. 2023 Dec 16;402(10419):2295-2306.

レジメン名称:Pembro+CBDCA+PEM(悪性胸膜中皮腫)

<u>1コースの日数:21日</u>

## 1-4コース目

No.	抗がん剤名	標準的投与量投与方法	投与時間	Day			
	(溶解液、支持療法も含む)		IX <del>II</del> 刀压	1文子时间	1	~	21
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5 分	$\circ$		
2	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	200 mg/body	点滴静注	30 分			
	生理食塩液	50 mL					
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	$\circ$		
4	パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75 mg (50 mL)					
	デキサメタゾン	9.9 mg	点滴静注	30 分	$\circ$		
	ホスネツピタント	235 mg					
6	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10 分	$\circ$		
	生理食塩液	100 mL					
7	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	1 時間	0		
	5%ブドウ糖液	250 mL					
8	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	$\circ$		

備考:治療1週間前より、副作用予防としてビタミンB121mg(9週間隔で筋注)及び葉酸0.5 mg(連日内服)の投与を開始する。