

対象患者： 非小細胞肺がん

根拠文献： J Clin Oncol. 2024 Oct 20;42(30):3593-3605.

レジメン名： Amivantamab皮下注+Lazertinib(80kg未満)

1コースの日数： 28日

1 コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day			
					1	8	15	22
1	生理食塩液	10 mL	腹部皮下注	5 分（プライミング用）	○	○	○	○
2	アミバンタマブ（遺伝子組換え） ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	1600 mg/body 20000 単位/body	腹部皮下注	5 分	○	○	○	○

2 コース目以降

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day			
					1	8	15	22
1	生理食塩液	10 mL	腹部皮下注	5 分（プライミング用）	○		○	
2	アミバンタマブ（遺伝子組換え） ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	1600 mg/body 20000 単位/body	腹部皮下注	5 分	○		○	

備考：

併用薬ラゼルチニブ240mg/day 連日内服。

アミバンタマブの投与開始60分前に前投薬(アセトアミノフェン1000mgとd-クロルフェニラミンマレイン酸塩2mg)を内服。

1コース目day1 は入院で投与。1コース目day8 降より外来運用あり。

アビキサバン 5mg/day 分2 少なくとも4ヶ月は服用。