

対象患者： 乳がん

根拠文献： N Engl J Med 2012;366:109,N Engl J Med .2017 July 23;122

レジメン名称： PER+HER+DTX

1コースの日数： 21日

**1コース目**

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	ペルツズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	840 mg/body 250 mL	点滴静注	1時間	○		
4	トラスツズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	1時間30分	○		
5	ドセタキセル 生理食塩液	75 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	1時間	○		
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

**2コース目以降**

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○		
2	ペルツズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	420 mg/body 250 mL	点滴静注	30分	○		
3	トラスツズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	6 mg/kg 250 mL	点滴静注	30分	○		
4	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
5	ドセタキセル 5%ブドウ糖	75 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	1時間	○		
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

浮腫予防として下記を内服。

・デキサメタゾン8mg/day分2 (day1-3)

※Day1夕より内服し、Day3朝まで内服 (計4回内服)