

対象患者：乳がん

根拠文献：Cortes J et al. Lancet 2020; 396: 1817-1828

レジメン名： Pembro+PTX(12w)

1コースの日数： 84日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day																							
					1	~	8	~	15	~	22	~	29	~	36	~	43	~	57	~	64	~	71	~	84			
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○						○						○					○						
2	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	200 mg/body 100 mL	点滴静注	30分	○						○						○					○						
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○						○						○					○						
4	ファモチジン デキサメタゾン 生理食塩液	20 mg 6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		○		○				○		○		○		○		○		○		○			
5	dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		○		○				○		○		○		○		○		○		○			
6	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	90 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		○		○				○		○		○		○		○		○		○			
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		○				○		○		○		○		○		○		○			

備考：