

対象患者： 尿路上皮がん 根拠文献：J Clin Oncol 2000; 17: 3068

レジメン名：GC(アキシ+ア7°レ°タト)

1コースの日数： 28日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
					1	2	3	4	5	~	8	~	15	~		
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		○	○	○			○		○		
2	ゲムシタビン 生理食塩液	1,000 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	○							○		○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○							○		○		
4	生理食塩液 3号液 (維持液)	500 mL 1,500 mL	点滴静注	23時間	○											
5	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分		○										
6	補正用塩化カリウム液 補正用硫酸マグネシウム液 生理食塩液	20 mEq 10 mEq 1,000 mL	点滴静注	2時間30分		○										
7	マンニトールS注射液®	100 mL	点滴静注	15分		○										
8	シスプラチン 生理食塩液	70 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	2時間		○										
9	マンニトールS注射液®	200 mL	点滴静注	30分		○										
10	補正用塩化カリウム液 補正用硫酸マグネシウム液 生理食塩液	20 mEq 10 mEq 1,000 mL	点滴静注	2時間30分		○										
11	生理食塩液 3号液 (維持液)	1,000 mL 1,500 mL	点滴静注	16時間		○										
12	生理食塩液 3号液 (維持液)	1,000 mL 1,500 mL	点滴静注	23時間45分			○	○	○							

備考：

制吐剤として下記を内服。

- ・ アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day2) 、 80 mg/day 分1 (Day3-4)
- ・ デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day3-5)