

対象患者： 子宮体がん 根拠文献：J Clin Oncol 2006; 24: 36

レジメン名： (ｲﾝﾄﾞ) ADR/CDDP (体癌)

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	8 mEq 10 mEq 500 mL	点滴静注	1時間	○		
2	デキサメタゾン グラニセトロン 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	ドキシソルピシン塩酸塩 生理食塩液	60 mg/m ² 50 mL	点滴静注	15分	○		
4	D-マンニトール注射液 20%	300 mL	点滴静注	45分	○		
5	シスプラチン 生理食塩液	50 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		
6	補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	10 mEq 500 mL	点滴静注	1時間	○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

- ・ アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1)、80 mg/day 分1 (Day2-3)
- ・ デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-4) 朝・昼食後