

対象患者： 頭頸部がん

根拠文献： Ann Oncol 2018; 29: 1004

レジメン名： PCE

1コースの日数： 21日

1コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day					
					1	～	8	～	15	～
1	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	6.6 mg 20 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		○			
2	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分					○	
3	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		○		○	
4	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		○	
5	セツキシマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	400 mg/m ² 500 mL	点滴静注	2時間	○					
6	セツキシマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間			○		○	
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		○	
8	グラニセトロン点滴静注バッグ	1 mg (50 mL)	点滴静注	15分	○		○			
9	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		○			
10	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 2.5 250 mL	点滴静注	1時間	○		○			
11	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○			

2コース目以降

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day					
					1	～	8	～	15	～
1	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	6.6 mg 20 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		○			
2	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分					○	
3	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		○		○	
4	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		○	
5	セツキシマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		○		○	
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		○	
7	グラニセトロン点滴静注バッグ	1 mg (50 mL)	点滴静注	15分	○		○			
8	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		○			
9	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 2.5 250 mL	点滴静注	1時間	○		○			
10	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○			

備考：最大6コース目まで