対象患者：頭頸部がん
 レジメン名：wPTX+Cmab
 1コースの日数：7日

根拠文献①：Ann Oncol. 2012 Apr;23(4):1016-22
 根拠文献②：Oral Oncol. 2013 Feb;49(2):182-5
 根拠文献③：Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Feb;271(2):373
 根拠文献④：Anticancer Drugs. 2012 Oct;23(9):996-1001

1コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	7
1	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	6.6 mg 20 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分			
4	セツキシマブ(遺伝子組換え) 生理食塩液	400 mg/m ² 500 mL	点滴静注	2時間	○		
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
6	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

2コース目以降

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	7
1	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	6.6 mg 20 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
4	セツキシマブ(遺伝子組換え) 生理食塩液	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
6	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

備考：