

対象患者：食道がん

根拠文献：Lancet 2021; 398: 27-40

レジメン名：FOLFOX+Nivo

N Engl J Med 2022; 386: 449-462

1コースの日数：14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	14
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○		
2	ニボルマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	240 mg/body 100 mL	点滴静注	30分	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
4	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン	0.75 mg (50 mL) 6.6 mg	点滴静注	15分	○		
5	レボホリナート 生理食塩液	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	○		
6	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	○		
7	フルオロウラシル	400 mg/m ²	ワンショット静注		○		
8	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
9	フルオロウラシル 生理食塩液	2400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	46時間	○		

備考：

制吐剤として下記を内服

デキサメタゾン8mg/day 分2 (day2-3)

Rp5及びRp6は同時に投与開始

Rp9はインフューザーポンプを使用