

対象患者： 頭頸部がん

根拠文献： Ann Oncol 2018; 29: 1004

レジメン名： PCE(biweekly)

1コースの日数： 14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	14
1	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	6.6 mg 20 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
4	セツキシマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	500 mg/m ² 500 mL	点滴静注	2時間	○		
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
6	グラニセトロン点滴静注バッグ	1 mg (50 mL)	点滴静注	15分	○		
7	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 2.5 250 mL	点滴静注	1時間	○		
9	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

・ 2022年9月にセツキシマブの上記用法・用量の追加承認。