

対象患者：頭頸部がん

レジメン名：wPTX+Cmab(Biweekly)

1コースの日数：14日

根拠文献①：Ann Oncol. 2012 Apr;23(4):1016-22

根拠文献②：Oral Oncol. 2013 Feb;49(2):182-5

根拠文献③：Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Feb;271(2):373-8

根拠文献④：Anticancer Drugs. 2012 Oct;23(9):996-1001

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	14
1	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	6.6 mg 20 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
4	セツキシマブ(遺伝子組換え) 生理食塩液	500 mg/m ² 500 mL	点滴静注	2時間	○		
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
6	生理食塩液	50 mL (ルート交換用)	点滴静注	15分	○		
7	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		
8	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

・2022年9月にセツキシマブの上記用法・用量の追加承認。