

対象患者： 唾液腺がん

根拠文献：Acta Otolaryngol 2016; 136: 948-51

レジメン名： Triweekly CBDCA+PTX

1コースの日数： 21日

| No. | 抗がん剤名<br>(溶解液、支持療法等も含む)    | 標準的投与量                          | 投与方法 | 投与時間 | Day |   |    |
|-----|----------------------------|---------------------------------|------|------|-----|---|----|
|     |                            |                                 |      |      | 1   | ～ | 21 |
| 1   | ファモチジン<br>デキサメタゾン<br>生理食塩液 | 20 mg<br>16.5 mg<br>50 mL       | 点滴静注 | 15分  | ○   |   |    |
| 2   | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩<br>生理食塩液 | 5 mg<br>50 mL                   | 点滴静注 | 15分  | ○   |   |    |
| 3   | パロノセトロン点滴静注バッグ             | 0.75 mg (50 mL)                 | 点滴静注 | 15分  | ○   |   |    |
| 4   | パクリタキセル<br>生理食塩液           | 200 mg/m <sup>2</sup><br>500 mL | 点滴静注 | 3時間  | ○   |   |    |
| 5   | カルボプラチン<br>5%ブドウ糖液         | AUC 6<br>250 mL                 | 点滴静注 | 1時間  | ○   |   |    |
| 6   | 生理食塩液                      | 50 mL                           | 点滴静注 | 15分  | ○   |   |    |

備考：

制吐剤として下記を内服

デキサメタゾン8mg/day 分2 (day2-3)